ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE
V. II 1679

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

M. Rochard Licentié En medecine ancien Chirurgien major des troupes du Roy, pensionné à meaux, Correspondant de L'academie Royale de Chirurgie; a lu à L'academie plusieurs observations

Dans la premiere, il Expose que vers La fin de L'Eté 1779 on amena à L'hotel-dieu de meaux le nommé Etienne Boulonnois agé de treize ans et demi, qui avoit une fracture à la partie moyenne inferieure de La cuisse gauche. L'Extremité Superieure perçoit La peau de la Longueur de trois a quatre pouces à travers L'aponevrose du fascia lata. il fut plus d'un mois sans avoir Les secours Efficaces. on L'amena en cet etat. il ne fut pas possible de parvenir à La reduction vu L'ancienneté de La fracture. L'auteur fit cependant des tentatives pour L'obtenir, mais Elles furent inutiles; il Employa Les Exfoliatifs. après quinze jours de soins La piece etoit deja alterée; quinze jours après elle tomba. Cet Enfant guerit, et il y eut trois pouces de Raccourcissement. Les deux Extremités de L'os se sont trouvées juxtaposées, et reunies par L'Effusion du suc osseux de L'une a L'autre. L'auteur ajoute ~~que L'on voit~~ que L'on voit a cette cuisse une vestige ou Stygmate qui forme une cicatrice tres Enfoncée

cote huit pages
A Dureau

ARC 40
n°45

Ensuite il demande s'il ne seroit pas preferable dans pareilles circonstances de scier la portion saillante de l'os pour en faciliter la reduction surtout dans les jeunes sujets, que d'appliquer des extensions forcées dont il est tres facile de calculer le danger!

Je reponds a la question de l'auteur que dans la circonstance qu'il rapporte puisqu'il faut necessairement que la chute de la piece saillante aie lieu, il vaudroit mieux l'accelerer ~~la chute~~ par l'application de la scie ou des caustiques; ces deux moyens produisent le meme effet, mais le second me paroit preferable a tous egards. Les bornes que ce rapport me prescrit, m'empechent d'en detailler les raisons.

Dans les observations suivantes il s'agit de plusieurs bubonnocelles.

Le sujet de la premiere est une femme qui avoit une hernie du coté droit. La tumeur etoit plus grosse que le poingt, molle, et presentoit des inegalités. La malade eprouvoit tous les accidens qui accompagne l'etranglement. L'auteur lui fit l'operation, et trouva une grosse masse d'epiploon qu'il dit lui en avoir imposé, il en fit la resection.
" j'arrivai, dit il, a une seconde tumeur, que je
" reconnus etre l'herniaire, je l'ouvris, je ne trouvai

» dans ce sac qu'une tres petite portion intestinale ;
» je debridai l'Etranglement par le pillier anterieur
» (ou l'anneau), je reduisis l'intestin et la malade
» est guerie. »

Il n'est pas Etonnant qu'une hernie Entero-Epiploocele presente une masse volumineuse d'Epiploon. cet accident arrive tres frequement dans la pratique journaliere. l'an passé mon pere fit cet operation au fils d'un marechal rue culture Ste catherine. il y avoit une portion d'epiploon si considerable qu'etendue elle recouvroit les deux extremités superieures des cuisses. mon pere en fit la reduction et le malade fut gueri en dix sept jours. + L'auteur ajoute qu'il debrida le pillier anterieur ou l'anneau ; cet expression ne me paroit pas juste ; le pillier anterieur fait partie de l'anneau, d'ailleurs ce pillier n'est pas l'obstacle principal a surmonter dans les hernies Etranglées. ce sont les fibres aponevrotiques transversales qui se trouvent a la partie superieure de l'anse qu'il est essentiel de couper et c'est en quoi consiste l'operation. il est cependant des cas ou l'on coupe les pilliers, mais ils sont rares, et ne peuvent s'appliquer aux principes generaux.

Dans la 2de observation il est question d'une hernie crurale qu'une dame portoit depuis 20 ans. la tumeur avoit cinq pouces ou environ de longueur

Et trois de Largeur, Elle etoit tendue et Renitente.
il n'y avoit aucun Changement de Couleur a la
peau vers La hanche, mais du Coté de la vulve
Elle etoit fort Enflammée, au point qu'il y avoit
une Espece de fluctuation ou disposition gangreneuse.
La maladie etoit Compliquée de tous Les accidens
qui determinent L'operation; il y avoit huit jours
qu'ils persistoient, L'auteur La fit:

" j'ouvris, dit il, le Sac qui se trouvoit Enveloppé "
La tumeur Graisseuse, Ce qui me parut fort extraordinaire, "
Car toujours Ce sont Les progrés ou allongemens du "
peritoine dont il est formé. L'intestin etoit Enveloppé "
de Cette Substance adipeuse; elle m'en imposa presque "
tout le temps de Cette operation. je devois etre fondé "
de La prendre pour une tumeur Epiploique; j'eus "
Beaucoup de peine a parvenir a L'anneau pour Le "
debrider; j'y arrivai, je Renversai Cette masse en "
dehors vers La hanche et En dessous vers La Cuisse "
je degageai L'intestin, Ce fut L'appendice du Cæcum "
que je decouvris, il etoit noir: je n'eus pas Beaucoup "
de peine a Suivre et a degager Le Reste. je laissai "
La portion intestinale a L'aide a La playe, en Cas "
de Suppurations et de Chute des parties Gangrenées, "
La malade mourut trois jours aprés."

il paroit que Ce qui En imposa a L'auteur
n'etoit autre Chose que L'Epiploon qui formoit Le

Sac herniaire. L'auteur dit que c'est toujours le peritoine ou ses allongemens qui forme le Sac, il voit par son observation et celle qu'il rapporte après que c'est quelquefois l'Epiploon. Le 9 fevrier 1783 je vis faire a l'hotel-dieu cet operation a un homme qui portoit une hernie depuis 25 ans. L'intestin etoit renfermé dans une portion d'Epiploon qui formoit le Sac. L'on a vu quelquefois l'appendice du cæcum donner lieu a une hernie.

Dans la 3eme observation il s'agit d'un homme agé de 60 ans qui avoit depuis quinze ans une hernie complette du coté droit, laquelle avoit toujours grossi par degrés, au point que le Scrotum avoit plus de huit a neuf pouces de longueur et au moins 16 a 17 de circonference. L'Etranglement et les Symptomes Subsistoient depuis quinze jours. L'auteur lui fit l'operation. à l'ouverture du Sac il sortit beaucoup de Serosité, presque toute la masse de l'Epiploon y etoit contenue et près de quatre pieds d'intestins. aussitot que l'Etranglement fut detruit presque tous les intestins sortirent avec Effort, et l'auteur eut beaucoup de peine a les faire rentrer. il en vint a bout. il reduisit ensuite l'Epiploon, le malade eut des Evacuations abondantes et guerit en peu de temps.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

Le Sujet de la 4me observation de Bubonnocele Est un homme agé de 72 ans qui avoit une hernie Etranglée et Enflammée depuis Six Jours. L'auteur Lui fit L'operation. Le Sac etoit Sec, L'Epiploon y Etoit Contenu, et Envelopoit L'intestin dont une portion grosse Comme une aveline Etoit pincée. L'Epiploon Etoit Enflammé Le malade avoit Le pouls tres mauvais, il mourut Le Lendemain.

5eme observation. Un homme agé de 55 ans tres fort, portoit depuis quinze ans une hernie Complette et tres volumineuse. Les accidens de l'Etranglement par Engouement de matieres Se manifesterent. L'auteur Employa Les remedes generaux tenta La reduction mais ne put L'obtenir. Le malade ne pouvoit par Rester La tete basse Les reins et les genoux elevés, L'auteur Lui fit Relever Le Scrotum par Le moyen d'une fronde fixée au Ciel du Lit. Le malade Evacua pendant quatre Jours et Sortit dix Jours apres En bon etat. L'auteur attribue une partie de Ce prompt Succés à La fronde dont il s'est Servi pour Suspendre Le Scrotum.

6eme observation. Une femme agée de 78 ans avoit une hernie Inguinale etranglée et Sphacelée. En palpant La tumeur, L'auteur Sentit une Crepitation Semblable a Celle qui accompagne L'Emphyseme. il Chercha

au bout de 42 jours
a accelerer La chute des Escarres et L'obtient. il y avoit trois semaines que La malade n'avoit evacué. aussitot que Les Escarres furent detachés une Grande quantité d'Excremens putrides sortit par La playe, La Bile coula ainsi que Les boissons dont Le malade faisoit usage. Elle fut trois mois sans evacuer par L'anus et resta pendant tout ce temps couchée sur Le dos, reduite a une diette tres severe Elle guerit. vers La fin de cette observation L'auteur en cite une pareille d'une demoiselle a qui il fit L'operation il y a trente sept ans, dont il donna La note a L'academie En juin 1749 sous La correspondance de M. Hevin.

7eme observation. Une femme agée de 42 ans avoit à La partie superieure de La fesse droite une playe avec issue d'Excremens. Elle En avoit une autre transversalle superficielle Longue de deux pouces et ovale à L'angle inferieur de la machoire inferieure du coté droit. L'arriere Bouche etoit Enflammée, Garnie d'ulceres et de chancres Legers. Les Glandes salivaires Etoient Engorgées, celles du mesentere obstruées. L'auteur ajoute qu'il croit que La cause de cette maladie Est un vice scrophuleux ou scorbutique. il decouvrit Ensuite

8/

une Tumeur molle oblongue de la Grosseur d'un oeuf d'oye Située precisement sur les apophyses Epineuses des vertebres Superieures dorsales. a la Suite de la Cessation de ses regles elle eut une fievre; un Chirurgien la Saigna du pied, et C'est dans Ce traitement que s'est fait l'irruption de cette matiere Excrementitielle. Il y a dix ans que la malade eut a l'endroit de Cette playe Stercorale un abscés qui s'ouvrit Spontanement, et se barit de lui meme. L'auteur n'a pas pu Suivre Cette maladie.

J'estime que Ces observations sont interessantes. L'on voit que l'auteur a Sçu faire une juste application des preceptes de M.M. Louis et Pipelet sur le traitement des hernies, Cependant elles n'ajoutent Rien aux Connoissances acquises et l'academie ne peut En faire usage.

Ce 1er Juin 1785. Mertrud f. 2e.